




Le respect
est dans
notre culture

PROTECTION DES CULTURES




www.desangosse.fr



CAMBIO[®] LA SOLUTION CLÉ

POUR VOTRE TRAITEMENT
DÉSHERBAGE ANTI-DICOTS DE POST-LEVÉE DU MAÏS

**AVEC CAMBIO :
L'ABOUTISSEMENT DE L'EFFICACITÉ**



Verrouillez votre récolte à double-tour



DE SANGOSSE
Les Hommes de proximité

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

CAMBIO®



CAMBIO® LA SOLUTION CLÉ POUR VOTRE TRAITEMENT

CAMBIO®, LA SOLUTION CLÉ QUI ENTRE DANS TOUS VOS PROGRAMMES DE DÉSHÉRBAGE

Stades du maïs		2-3 feuilles à 6 feuilles	7 à 9 feuilles
Pré-levée puis Post-levée		Cas général : Flore mixte annuelles et vivaces CAMBIO 2 à 2,5L/ha + adjuvant*	
Anti-graminées Harness Microtech conseillé		Forte pression liserons ou adventices à levées échelonnées CAMBIO 1,5 à 2L/ha + adjuvant*	PUIS CAMBIO1L/ha+adj.*
CAMBIO, le concentré de performances qui booste l'efficacité de vos programmes herbicides pour lutter contre des flores très complexes			
Harness Microtech	PUIS	Forte pression Ambroisie T1 Ambroisie < 10 cm et avant 6 F du maïs CAMBIO 1,5 L/ha + MIKADO 0,5 L/ha (ou Callisto 0,5 L/ha) ou CAMBIO 1,5 L/ha + EMBLEM 1,5 Kg/ha (ou Cadéli 0,7 L/ha)	T2 2 semaines plus tard et avant 8-9 F du maïs CAMBIO 1 L/ha + MIKADO 0,5 L/ha (ou Callisto 0,5 L/ha)
Harness Microtech + Lagon	PUIS	Ambroisie < 10 cm et avant 6 F du maïs CAMBIO 1,5 L/ha + MIKADO 0,5 L/ha CAMBIO 1,5 L/ha + EMBLEM 1,5 Kg/ha (ou Cadéli 0,7 L/ha)	OU CAMBIO 1 L/ha + EMBLEM 2 Kg/ha
CAMBIO complète avantageusement le spectre de certaines spécialités de la famille des tricétones du type CALLISTO ou MIKADO			
		Forte pression toutes dicotylédones coriaces et vivaces : "mélange triple" CAMBIO 1,5 L/ha + CALLISTO 0,4 L/ha ou MIKADO 0,5 L/ha + EMBLEM 1 kg/ha (ou Cadéli 0,5L/ha)	PUIS CAMBIO 1 L/ha si liserons
Tout-en-post		CAMBIO 1,5 L/ha + EQUIP 1,2 L/ha ou Pampa Premium ou Milagro extra 0,4 L/ha + CALLISTO 0,4 L/ha ou MIKADO 0,5 L/ha	PUIS CAMBIO 1,5 L/ha + EQUIP 1,2 L/ha ou Pampa Premium ou Milagro extra 0,35 L/ha + CALLISTO 0,4 L/ha ou MIKADO 0,5 L/ha
		Forte pression Mercuriales Préférer EMBLEM 1 kg/ha à la place de Callisto ou Mikado dans le mélange ci-dessus	Forte pression Mercuriales Préférer EMBLEM 1 kg/ha à la place de Callisto ou Mikado dans le mélange ci-dessus
L'association de CAMBIO + sulfonylurées + tricétones peut être réalisée dans certains cas, sous réserve du strict respect de conditions d'emploi particulières : doses, stades, adventices, spécialités commerciales, températures. Nous consulter pour plus d'information.			

*ADJUVANT : Très important, ajouter en premier dans la cuve un adjuvant type Li 700, Elton, Transit. Huile végétale ou minérale possible à leurs doses recommandées.

CAMBIO® : marque déposée BASF AGRO. AMM n°9800477 320g/l bentazone, 90 g/l dicamba Xn nocif / R22 - Li 700 : marque Loveland inc. AMM n°90 00 809. Xi irritant - ELTON : marque Agridyne. AMM n°96 00 107. Xi irritant - TRANSIT : marque Agridyne. AMM n°96 00 108. Harness Microtech : AMM n° 9700562. 400 g/l acétochlorure + 66,7 g/l dichlorimide. Xi irritant - R43 - AQUA. Marque déposée Monsanto. Lagon : AMM n° 9600548. 75 g/l isoxaflutole + 500 g/l acétochlorure. AQUA. Marque déposée Bayer CropSciences. Xi irritant - EMBLEM : marque déposée Nufarm S.A. AMM n°9200493. Xn nocif - MILAGRO EXTRA 60D : marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta. AMM n°2080026. Xi irritant - PAMPA PREMIUM 60D : marque déposée ISK Biosciences Europe ; AMM n°2080026. Xi irritant - EQUIP : marque déposée Bayer AMM n° 2000301 Xi irritant - CALLISTO : marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta. AV n° 9900047 Xi irritant, N - MIKADO : marque déposée Bayer. AMM n° 9100297 Xn Nocif. CADELI : marque MAKHTESHIM AGAN. AMM n° : 9900016. Xn Nocif ; N. Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels disponibles le site <http://e-phy.agriculture.gouv.fr>. Pour éviter tout risque pour l'homme ou l'environnement, avant toute utilisation lire l'étiquette des produits et la notice d'emploi et respecter strictement les doses et les précautions d'emploi.

Remarque générale : pour obtenir les efficacités maximum, sur DICOTS, intervenir sur plantes peu développées (moins de 4 feuilles), sur LISERONS, intervenir au stade 20 à 30 cm.



► CAMBIO®, UNE ACTION CIBLÉE SUR LES DICOTS QUI POSENT DES PROBLÈMES

- 1. SOUPLESSE :** CAMBIO® s'utilise en post-levée du maïs, dès le stade 2-3 feuilles jusqu'au stade 8-9 feuilles de la culture.
- 2. EFFICACITÉ / RÉGULARITÉ :** CAMBIO® élimine rapidement la concurrence des mauvaises herbes dicotylédones annuelles et vivaces vis-à-vis du maïs.
- 3. PASSE-PARTOUT :** CAMBIO®, le désherbage raisonné. Sélectif, CAMBIO® s'intègre facilement à tout type de stratégie "pré puis post" en "tout en post"
- 4. SÉCURITÉ :** L'efficacité et la sélectivité de CAMBIO® permettent au maïs d'exprimer pleinement son potentiel de rendement ainsi que ses qualités nutritionnelles à la récolte.

AMBROISIE À FEUILLE D'ARMOISE



DATURA STRAMOINE



LISERON DES HAIES



RENOUEE LISERON



► UN DÉSHÉRBAGE RAISONNÉ POUR UNE AGRICULTURE RAISONNABLE



5 points clés pour réussir votre désherbage de post-levée

- Connaître la flore de la parcelle,
- Savoir reconnaître les adventices nuisibles,
- Intervenir sur des adventices jeunes, avant 3 feuilles des graminées et 4 feuilles des dicotylédones,
- En cas d'observation de levées échelonnées, ou sur les adventices de nuisibilité élevée, prévoir un deuxième passage 10 à 20 jours après la première application,
- Réaliser son intervention herbicide pendant les périodes d'hygrométrie les plus élevées.

En infestation moyenne, un passage de CAMBIO® est suffisant dans la majorité des cas. CAMBIO® est utilisé seul en présence d'espèces sensibles.

► CAMBIO®, EFFICACE SEUL ET REDOUTABLE EN ASSOCIATION

	PROGRAMMES PRÉ + POST-LEVÉE					PROGRAMMES TOUT EN POST-LEVÉE		
	Harness M puis Cambio 2 à 2,5 + Li 700	Harness M puis Cambio 1,5 + Callisto 0,4	Harness M puis Cambio 1,5 + Emblem 1,5 ou Cadeli 0,7	Harness M puis Cambio 1,5 + Callisto 0,41 + Emblem 1 ou Cadeli 0,7 puis Cambio 1	CAMBIO 1 + Pampa Premium 0,3 + Callisto 0,4	CAMBIO 1 + Pampa Premium 0,4 + Emblem 1	CAMBIO 1 + Pampa Premium 0,25 + Callisto 0,3	Doses exprimées en litre ou kilo/ha des spécialités commerciales.
Abutilon de Théophraste								
Amarante réfléchie								
Ambroisie à feuilles d'Armoise								
Chénopode blanc								
Datura Stramoine								
Erodium f de cigüe								
Geranium disséqué								
Lampourde à gros fruits								
Mercuriale annuelle								
Morelle noire								
Renouée liseron								
Liseron des haies								
Rumex grande oseille								
Gaillet								
Laiteron								

% d'efficacité de traitement
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%

CAMBIO'NET

RECONNAÎTRE ► IDENTIFIER ► TRAITER

Outil interactif d'aide au traitement **contre les adventices sur maïs**.

Retrouvez-nous sur www.desangosse.fr ou www.cambio-herbicide.fr

- Notice technique et recommandation d'emploi en ligne
- Jeu en ligne : Testez-vous à reconnaître toutes les adventices présentes dans le maïs !!!

► Tout savoir sur les adventices du maïs :

- Plantule
- Plante adulte
- Famille
- Typologie
- Fréquence
- Caractéristiques
- Concurrence par rapport à votre culture maïs
- Solutions de désherbage associées

► Stratégie de traitement en ligne :

- Reconnaissez les adventices présentes dans votre champ
- Identifiez-les !
- Trouvez la solution de traitement associée la plus efficace.



► Avec Cambio®, verrouillez votre récolte à double-tour !



1 Un désherbage sûr en post-levée :

- Un désherbage puissant contre les annuelles,
- Une solution herbicide sur la flore émergente,
- Une référence sur les vivaces.

2 Le maïs peut exprimer pleinement son potentiel :

- Elimination rapide de la concurrence :
2 jours sur annuelles, 4 à 6 jours sur vivaces,
- Formulation originale, sélective qui s'associe pour un spectre plus large.
- Double mode d'actions différents : excellente stratégie contre la sélection de plantes résistantes.



N° AMM : 9800477

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Usages et doses points forts

- 320g/l Bentazone
- 90g/l Dicamba

• Familles chimiques :

Benzothiadiazones et acides benzoïques

• Modes d'actions

- Bentazone : absorbé essentiellement par les parties vertes des plantes, inhibe la photosynthèse. Agit par contact.
- Dicamba : désordonne la croissance des adventices surtout de l'élongation cellulaire, il perturbe la régulation de l'enzyme AIA.

• Formulation : SL

• Conditionnements : 5 L - 20 L

USAGES ET DOSES

- Culture : Maïs
- Usage : Anti-dicotylédones annuelles et vivaces
- Dose : 2,5 L/ha

RÉGLEMENTATION

- Classement : Xn Nocif
- Phrase de risque : R22, R43
- ZNT : 5 mètres
- DAR en jours : 90
- LMR en mg/kg : Bentazone 0,1 ; Dicamba 0,05
- DRE : 48 heures

STOCKAGE ET TRANSPORT

- Point gel : -10° C cristallisation
- Classe stockage : 1510
- Classement transport : NC

DE SANGOSSE - Bonnel - BP N°5 - 47480 PONT DU CASSE - TÉL. 05 53 69 36 30 - FAX. 05 53 66 30 65 - www.desangosse.fr

Lire attentivement l'étiquette du bidon avant toute utilisation pour éviter tout risque par rapport à l'homme et à l'environnement. Respecter les doses et les usages. Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels disponibles le site <http://e-phy.agriculture.gouv.fr>. « Edition Septembre 2009, annule et remplace l'édition précédente ». Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application auprès du tél. 05 53 69 36 30 qu'il dispose de la dernière version à jour de ce document. Réalisation A LA UNE Conseil



DE SANGOSSE
Les Hommes de proximité